গণপ্রজাতনী বাংশাদেশ সরকার ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর जेयध ज्वन, भश्राचानी, गका-১২১২

## www.dgda.gov.bd

শারক নং-ডিজিডিএ/পিভি-মিটিং/ADRAC-২০১৮/ 008 b

তातिथः 20.../.2.2./२०১४

বরাবর	
ব্যবস্থাপনা	পরিচালক/সিইও/স্বত্ত্বাধিকারী

বিষয়ঃ WHO Pharmaceuticals Newsletter (Issue 4 & 5, 2018) এবং Pharmaworld এ প্রকাশিত বিভিন্ন জেনেরিকের ADR সম্পর্কিত তথ্য অবহিত করণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ADRAC এর ৯ম সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের (কপি সংযুক্ত) পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত ১০ (দশ) টি জেনেরিকের পার্শ্বে বর্ণিত ADR সমূহ এবং ADRAC কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আপনার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিবন্ধিত ঔষধ/ ঔষধসমূহের Packaging materials (Insert/ leaflet)/ Promotional materials-এ অন্তর্ভুক্ত করত: যথানিয়মে আপডেট করে অত্র অধিদপ্তর হতে অনুমোদন গ্রহণের জন্য বলা হল ঃ

SI. No	Name of Medicine	Adverse Drug Reaction	Recommendation by ADRAC
1.	Benzocaine	Risk of blood disorder (methemoglobinemia)in infants and children	Warning: Methemoglobinemia  Contraindication: Infant & Children younger than two years.
2.	Fluoroquinolone antibiotics	Risk of hypoglycemia and mental health adverse effects	Box Warning:  Increased risk of tendinitis and tendon rupture
3.	Granulocyte-colony stimulating factor (G- CSF) drugs	Risk of large vessel vasculitis	Adverse Effects: Large vessel vasculitis.  Warning: Allergic reactions, Splenic rupture, Alveolar hemorrhage hemoptysis and Sickle cell disorders.  Contraindication: Patients with known hypersensitivity to E-Coli derived proteins.
4.	Metronidazole	Risk of hepatic impairment     Severe hepatotoxicity or acute hepatic failure resulting in mortality was reported in patients with Cockayne's syndrome.	Adverse Effects: Chance of severe hepatotoxicity and hepatic failure in patients with Cockayne's syndrome.  Risk of hepatic impairment.
5.	Erythropoletins	Risk of Severe cutaneous adverse reactions (SCAR)	Adverse Effects: Severe cutaneous adverse reactions (SCAR) & Stevens Johnsons Syndrome.
6.	Desogestrel	Severe psychiatric disorders: panic attack, suicidal ideation and self-induced injurious behavior.	Adverse Effects: Panic attack, suicida ideation and self-induced injurious behavior.
7.	Ceftriaxone	Risk of convulsions and involuntary imovements	Risk of convulsions and involuntary movements as Adverse Effects.
8.	Neuromuscular blocking agents (e.g-suxamethonium, pancuronium, and vecuronium)	Prevention of unintended paralysis through medication errors	To UPDATE label to include a warning indicating that the product is a PARALYSING AGENT.
9)	Ulipristal	New measures to minimize risk of liver injury	Contraindication: Ulipristal is not recommended for use in patients with liver disease.
10.	Amlodepine	Alopecia	Adverse Effect: Alopecia.

মেজর জেনারেল মোঃ মোন্ডাফিজুর রহমান

মহাপরিচালক ঔষধ প্রশাসন অধিদন্তর

रहग्राद्रभान, ADRAC

त्मानः bevovovo, deda.gov@gmail.com

णातियाः <u>२०./.५२./२०</u>১४

শারক নং-ডিজিডিএ/পিভি-মিটিং/ADRAC-২০১৮/008-6-সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের ভান্য অনুশিপি প্রেরণ করা হল: সদা অবানত ও এনোজনাম ক্রম্ম অক্সামজনা অনুনা । ১। মহাপরিচালক , ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর , মহাখালী , ঢাকা। ২। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী , খাস্থ্য অধিদপ্তর , মহাখাণী , ঢাকা।

পরিচার্কি (চলতি দায়িত্) উগধ প্রশাসন অধিদপ্তর